

- 1º. **Suspender el contacto inmediato con el medio de contraste.**
  
- 2º. Valorar **nivel de conciencia.**
- ·SITUACIÓN 1: PACIENTE INCONSCIENTE:
  - LLAMAR AL EQUIPO DE EMERGENCIAS
  
  - ·SITUACIÓN 2: PACIENTE CONSCIENTE:
    - LLAMAR AL RADIOLOGO PUESTO DE URGENCIAS
  
- 3º. **Valorar Vía área:**
  - **TODOS LAS SITUACIONES:** Apertura y retirada de cuerpos extraños (dentadura, secreciones).
    - **·SITUACIÓN 1: INCONSCIENTE Y SIN RESPIRACIÓN ESPONTÁNEA:**
      - Selección de cánula orofaríngea adecuada y colocación de la misma.
      - Iniciar maniobras de RCP básica: 30 compresiones centrotorácicas seguidas de 2 insuflaciones.
        - Continuar hasta que llegue el equipo de emergencias.
  
    - **SITUACIÓN 2: INCONSCIENTE Y CON RESPIRACIÓN ESPONTÁNEA:**
      - Mantenimiento de la permeabilidad de la vía aérea mediante la utilización de **cánula orofaríngea** adecuada para el paciente.
        - Mantener en posición de seguridad.
  
- 4º. Evaluación **RÁPIDA** de otros **signos de compromiso vital y alarma:** (DESDE CABEZA-PIES)
  - Agitación.
  - Palidez y sudoración cutánea. Cianosis.
  - Eritema generalizado. Edema de párpados-orofaringe. **MIRAR PRESENCIA DE EDEMA DE UVULA.**
    - Frecuencia respiratoria y uso de musculatura accesoria.
    - Pulso. Auscultación cardio-respiratoria.

## Guía básica ante reacción adversa a contrastes

Escrito por Administrator

Sábado 03 de Noviembre de 2012 13:48 - Última actualización Lunes 05 de Noviembre de 2012 10:17

---

- 5º. Aporte de **oxígeno**:
- Situación de PCR: Ventilación con mascarilla AMBU conectado a bolsa y oxígeno.
- Inconciencia con respiración espontánea: Mascarilla con reservorio al 100%.
- Conciente: Mascarilla ventimask al 50%.
  
- 6º. Plantear requerimientos de **fármacos de 1º línea**:
- ADRENALINA.
- DIACEPAN.
  
- 7º. **Monitorización** de Frecuencia Cardíaca y ritmo, Tensión Arterial y Sat O2.
- 8º. Valorar requerimientos de **aporte de líquidos**:
- Infusión en cargas de 300ml de Suero fisiológico 0.9%.
  
- 9º. Administración de **tratamiento sintomático** si procede.
- NOTA: VER GUIA DE TRATAMIENTO ANTE REACCIONES ADVERSA . [http://radiologiamarbella.com/joomla/index.php?option=com\\_content&view=article&id=166:reacciones-a-contrastes&catid=93:cosas-urgentes&Itemid=105](http://radiologiamarbella.com/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=166:reacciones-a-contrastes&catid=93:cosas-urgentes&Itemid=105)
  
- 10. Determinar la duración, soporte requerido y lugar de observación. NOTA: VER PROTOCOLO DE OBSERVACIÓN TRAS REACCIONES ADVERSA A MEDIOS DE CONTRASTE. [www.radiologiamarbella.com](http://www.radiologiamarbella.com)