

REACCIÓN ADVERSA LOCAL: GUÍA DE ACTUACIÓN ANTE EXTRAVASACIÓN DE CONTRASTE RADIOLOGICO

- **1º. Detener exploración radiológica.**
- **2º Retirar vía y realizar maniobras para minimizar el deposito en los tejidos.**
- **3º. Iniciar tratamiento local:**
 - Elevación del brazo.
 - Aplicación de frío local.
 - Vendaje compresivo en reacciones moderadas-severas.

- **4º. Llamar al radiólogo responsable de la exploración.**
- **5º. Estimar la cuantía aproximada de la extravasación y valoración de la respuesta inflamatoria local (leve, moderada, severa):**
 - **LEVE:**
 - Aportar hoja con recomendaciones sobre cuidados locales +/- tratamiento Antiinflamatorio VO si precisa.
 - Acudir a SUH en caso empeoramiento

 - **MODERADA:**
 - Aportar hoja con recomendaciones sobre cuidados locales.
 - Tratamiento analgésico-Antiinflamatorio VO
 - PLANTEAR CONTROL EN 24H

 - **SEVERA o Sospecha de Síndrome Compartimental**
 - Interconsulta a **Traumatólogo de guardia.**
 - PLANTEAR OBSERVACIÓN-INGRESO HOSPITALARIO.

- **6º Registro de la reacción adversa local en:**
 - Historia del paciente: **se incluirá en el informe radiológico**
 - Página web: www.radiologiamarbella.com

Se puede plantear realizar una radiografía del miembro para cuantificar la cantidad de contraste extravasado (en ocasiones, incluso una TC, sobre todo si hay duda de la fuga de

Extravasación contrastes

Escrito por Administrator

Sábado 03 de Noviembre de 2012 18:15 - Última actualización Sábado 03 de Noviembre de 2012 18:16

contraste), si bien esto no viene recogido en las guías.