

### REACCIÓN ADVERSA LOCAL: GUÍA DE ACTUACIÓN ANTE EXTRAVASACIÓN DE CONTRASTE RADIOLOGICO

- **1º. Detener exploración radiológica.**
- **2º Retirar vía y realizar maniobras para minimizar el deposito en los tejidos.**
- **3º. Iniciar tratamiento local:**
  - Elevación del brazo.
  - Aplicación de frío local.
  - Vendaje compresivo en reacciones moderadas-severas.
  
- **4º. Llamar al radiólogo responsable de la exploración.**
- **5º. Estimar la cuantía aproximada de la extravasación y valoración de la respuesta inflamatoria local (leve, moderada, severa):**
  - **LEVE:**
    - Aportar hoja con recomendaciones sobre cuidados locales +/- tratamiento Antiinflamatorio VO si precisa.
    - Acudir a SUH en caso empeoramiento
  
  - **MODERADA:**
    - Aportar hoja con recomendaciones sobre cuidados locales.
    - Tratamiento analgésico-Antiinflamatorio VO
    - PLANTEAR CONTROL EN 24H
  
  - **SEVERA o Sospecha de Síndrome Compartimental**
    - Interconsulta a **Traumatólogo de guardia.**
    - PLANTEAR OBSERVACIÓN-INGRESO HOSPITALARIO.
  
- **6º Registro de la reacción adversa local en:**
  - Historia del paciente: **se incluirá en el informe radiológico**
  - Página web: [www.radiologiamarbella.com](http://www.radiologiamarbella.com)

Se puede plantear realizar una radiografía del miembro para cuantificar la cantidad de contraste extravasado (en ocasiones, incluso una TC, sobre todo si hay duda de la fuga de

## **Extravasación contrastes**

Escrito por Administrator

Sábado 03 de Noviembre de 2012 18:15 - Última actualización Sábado 03 de Noviembre de 2012 18:16

---

contraste), si bien esto no viene recogido en las guías.